

Bewertungsbogen

Die mit einem Stern gekennzeichneten Items (4, 6, 27, 28 A oder 7B) müssen neu – wie unten aufgeführt -bewertet werden, bevor die Rohsummenwerte addiert werden und der Referenz-tabelle zugewiesen werden, um den Standard Score zu erhalten. Weil die Items 22-24 zu beiden Indizes gehören, Interne Kontextfaktoren/ Adjustment - und Partizipation –Index, ist der Summescore geringer als die Summe aus den drei Subskalen.

Fähigkeiten Index

Item 4 Hören:

wenn der Originalscore für Item 4 0 war, dann ist der neue Score ebenfalls 0
 wenn der Originalscore 1, 2 oder 3 war, dann ist der neue Score 1
 wenn der Originalscore 4 war, dann ist der neue Score 3

A Neuer Wert für Item 4 = _____

B Summenwert für Items 1-3 und 5-12 = _____

(verwendet wird der höchste Score für 7 a o. 7 b- verbale / nonverbale Kommunikation)

Summe von A + B = Rohsummenwert für die Fähigkeiten-Subskala _____

(Wert in die Tabelle unten eintragen)

Interne Kontextfaktoren / Einstellungs-Index (englisches Original: Adjustment)

Item 16 Schmerz und Kopfschmerz:

wenn der Originalscore für Item 16 0 war, dann ist der neue Score ebenfalls 0
 wenn der Originalscore 1, oder 2 war, dann ist der neue Score 1
 wenn der Originalscore 3 oder 4 war, dann ist der neue Score 2

C Neuer Wert für Item 16 = _____

D Summenwert für Items 13 -15 und 17 -24 = _____

Summe von C und D = Rohsummenwert für die

Einstellungs/ Adjustment- Subskala

(Wert in die Tabelle unten eintragen)= _____

Partizipation-Index

Item 27 Mobilität / Transportation:

wenn der Originalscore für Item 27 0 oder 1 war, dann ist der neue Score ebenfalls 0
 wenn der Originalscore 2 oder 3 war, dann ist der neue Score 1
 wenn der Originalscore 4 war, dann ist der neue Score 3

Item 28 Bezahlte Tätigkeit (Voll- und Teilzeitbeschäftigung)/ Unbezahlte Tätigkeit (Hausfrau, Student/in; Ehrenamt):

wenn der Originalscore für Item 28 0 war, dann ist der neue Score ebenfalls 0
 wenn der Originalscore 1 oder 2 war, dann ist der neue Score 1
 wenn der Originalscore 3 oder 4 war, dann ist der neue Score 3

E Neuer Wert für Item 27 = _____

F Summenwert für Item 28 A oder B = _____

G Summescore Item 22-24 _____

H Summenwert für Items 25, 26 und 29 _____

Summe von E bis H = _____

Rohsummenwert Partizipation-

Subskala (Wert in die Tabelle unten eintragen) = _____

Die Referenz-Tabelle wird verwendet, um die Rohwerte in Standardwerte zu konvertieren

	Rohwerte(aus der Zeile oben)	Standard (erhalten aus der Referenz-Tabelle)
I Fähigkeiten Subskala (Item 1-12)		
II Interne Kontextfaktoren/ /Einstellungs- Subskala Index (Item 13-24)		
III Partizipation- Subskala (Item 21-12)		
IV Zwischenwert der Subskalen-Rohsummen-Werte		
V Summenwert für Item 22-24		
VI Subtraktion Summenwert V von IV = Gesamtsummenwert		